



Risposte esatte ai Test di Verifica

Nefroangiosclerosi maligna: un caso a sorpresa

A. Capitanini, I. Petrone

Test di Verifica - 1, Pag. 4

Domanda n. 1: risposta esatta A:

a) Fistole artero venose parenchimali renali

Domanda n. 2: risposta esatta B:

b) Normale

Porpora trombotica trombocitopenica e insufficienza renale

S. Farsetti, C. Somma, L. Caroti, C. Cirami, F. Bergesio, S. Bandini, M. Salvadori

Test di Verifica - 2, Pag. 7

Domanda n. 1: risposta esatta D:

d) Tutti i precedenti

Pazienti trattati con mitomicina, ciclosporina, tacrolimus, chinino, combinazioni di più farmaci chemioterapici o pazienti che hanno ricevuto un trapianto di midollo, possono sviluppare un'anemia microangiopatica, con formazione di trombi sia a localizzazione prevalentemente renale che a livello sistemico; clinicamente quindi è possibile avere sia un quadro di SEU che di porpora trombotica trombocitopenica.

Domanda n. 2: risposta esatta B:

b) Mutazioni genetiche a carico del gene 9q34

Pazienti con porpora trombotica trombocitopenica familiare, presentano frequentemente, a livello plasmatico, un anomalo contenuto di multimeri di vW di grandi dimensioni. L'attività enzimatica di ADAMTS 13 in questi pazienti è assente o quasi indosabile, come conseguenza di mutazioni in omozigosi o di doppia eterozigoti a carico del gene 9q34, che codifica per ADAMTS 13. Nella maggioranza dei pazienti con grave deficit familiare di ADAMTS 13, gli episodi di PTT cominciano solitamente nell'infanzia o nella prima adolescenza, con successive ricadute croniche.

Domanda n. 3: risposta esatta E:

e) Tutti i precedenti

ADAMTS 13 è una metallo-proteasi, appartenente alla famiglia delle proteasi calcio e zinco dipendenti. Questo enzima, prodotto principalmente dal fegato, degrada i multimeri di vW attraverso il clivaggio dei legami peptidici tra le subunità monometriche del fattore di vW in posizione 242-843 (tra tirosina e metionina).



Parte seconda

Modelli funzionali di salute	Non alterato	Alterato	A rischio di alterazione
Percezione e gestione della salute		X	
Fisico Nutrizionale-metabolico		X	
Eliminazione		X	
Attività-esercizio		X	
Sonno-riposo		X	
Cognitivo-percettivo		X	
Percezione di sé e concetto di sé			X
Ruolo-relazioni	Dati non rilevanti		
Sessualità-riproduzione	Assenza dati		
Coping -tolleranza allo stress	Assenza dati		
Valori-convinzioni	Assenza dati		

Il peso della non-diagnosi: deficit di adenina fosforibosil transferasi diagnosticato in seguito a nefropatia da cristalli in ricevente di trapianto renale

A. Airoidi, G.B. Fogazzi, D. Palmieri, E. Lazzarich, V. Micheli, C. Bozzola, G. Monga, G. Bollée, M. Daudon, P. Stratta

Test di Verifica - 3, Pag. 17

Domanda n. 1: risposta esatta B:

b) Tra il 15 e il 50%

Domanda n. 2: risposta esatta B:

b) 2

Domanda n. 3: risposta esatta C:

c) Allopurinolo

Una dermatosi bollosa in dialisi peritoneale: possibile ruolo dei plastificanti

R. Russo, V. Valicenti, R. Corciulo

Domande, Pag. 23

Domanda n. 1: risposta esatta C:

c) Pseudoporfiria

Domanda n. 2: risposta esatta C:

c) Epidermiolisi bollosa

Domanda n. 3: risposta esatta C:

c) Furosemide

Emodialisi a oltranza o dialisi peritoneale?

G. D'Adamo, A. Scipioni, G. Pasquini, L. Lui, F. Forte, C. Spinelli

Test di Verifica - 4, Pag. 28

Domanda n. 1: risposta esatta B:

b) Impossibilità di inserire il catetere peritoneale

Domanda n. 2: risposta esatta B:

b) Preferibilmente all'inizio del trattamento sostitutivo

Domanda n. 3: risposta esatta D:

d) Tutte le precedenti

Cuore-Fegato-Rene: quando l'unione non fa la forza

G. Ferro e M. Masini

Test di Verifica - 5, Pag. 31

Domanda n. 1: risposta esatta D:

d) Tutte le precedenti

Domanda n. 2: risposta esatta A:

a) Ventricolo sinistro dilatato

Domanda n. 3: risposta esatta C:

c) Entrambe